

## 予防接種スケジュール その1

受診する回数を最小限にするパターン(一度にたくさん接種するパターン)

### 生後2か月から1歳になるまで



腕と大腿(ふともも)に  
1本ずつ接種します



肺炎球菌① + 五種混合① + B型肝炎① + ロタ①

↓ 4週あける

肺炎球菌② + 五種混合② + B型肝炎② + ロタ②

↓ 4週あける

肺炎球菌③ + 五種混合③ + ( + ロタ③ )

↓ 1～4週あける

BCG

↓ B型肝炎① 接種後140日(20週)あけて

B型肝炎③

★ ロタウイルスワクチンは  
飲むワクチンです

必ず生後14週6日までに  
開始します

2回接種の製品(ロタリックス)

3回接種の製品(ロタテック)

どちらかを選んでいただきます

### 1歳になったら



腕に2本ずつ接種します  
大腿には接種しません



肺炎球菌④ + 五種混合④ + 麻疹風疹① + 水痘①

↓ 水痘① 接種後3～6ヶ月あけて

水痘② + おたふく① ※おたふくワクチンは任意接種

### 3歳～4歳

日本脳炎①

↓ 1～4週あける

日本脳炎②

↓ 半年あける(4歳)

日本脳炎③

※日脳は生後6ヶ月から接種可能

### 小学校入学前(年長クラス)

• 麻疹風疹(MR)②

• おたふく② (任意接種)

(おたふく① 接種後4～5年)

### 小学校入学後

• 日本脳炎2期(9歳～13歳未満)

• 二種混合(11歳～13歳未満) ※小6で接種券・問診票が送付されます

• HPV①②③(子宮頸がんワクチン)(小6～高1相当)

## 予防接種スケジュール その2

### 1回の受診で注射の本数を2本以下（両腕のみ）とするパターン

#### 生後2か月から1歳になるまで

★ ロタウイルスワクチンは飲むワクチンです

- ・必ず生後14週6日までに開始します
- ・2回接種の製品（ロタリックス）もしくは3回接種の製品（ロタテック）のどちらかを選んでいただきます

#### <2回接種（ロタリックス）>

肺炎球菌① + 五種混合① + ロタ①

↓ 1週あける

B型肝炎①

↓ 3週以上あける

肺炎球菌② + 五種混合② + ロタ②

↓ 1週以上あける

B型肝炎②

↓ 3週以上あける

肺炎球菌③ + 五種混合③

↓ 1～4週程度あける

BCG

↓ B型肝炎①接種後

140日（20週）あけて

B型肝炎③

#### <3回接種（ロタテック）>

肺炎球菌① + 五種混合① + ロタ①

↓ 1週あける

B型肝炎①

↓ 3週以上あける

肺炎球菌② + 五種混合② + ロタ②

↓ 1週以上あける

B型肝炎②

↓ 3週以上あける

肺炎球菌③ + 五種混合③ + ロタ③

↓ 1～4週程度あける

BCG

↓ B型肝炎①接種後

140日（20週）あけて

B型肝炎③

#### 1歳になったら

肺炎球菌④ + 五種混合④

↓ 1週あける

麻疹風疹① + 水痘①

↓ 水痘①接種後

↓ 3～6ヶ月あけて

水痘② + おたふく①

※おたふくは任意接種

#### 3歳～4歳

日本脳炎①

↓ 1～4週あける

日本脳炎②

↓ 半年あける（4歳）

日本脳炎③

※日脳は生後6ヶ月から

接種可能

#### 小学校入学前 （年長クラス）

・麻疹風疹(MR)②

・おたふく②（任意接種）

（おたふく①接種後

4～5年）

#### 小学校入学後

- ・日本脳炎2期（9歳～13歳未満）
- ・二種混合（11歳～13歳未満） ※小6で接種券・問診票が送付されます
- ・HPV①②③（子宮頸がんワクチン）（小6～高1相当）