

# 予防接種スケジュール おすすめプラン その1

## 受診する回数を最小限にするパターン（1度にたくさん接種するパターン）

### 生後2か月から1歳未満

#### <①定期接種のみ(基本パターン)>

肺炎球菌① + ヒブ①  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合①  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合②  
 ↓ 4週あける  
 四種混合③ + BCG

#### <②定期+ロタウイルス>

肺炎球菌① + ヒブ① + ロタ①  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合① + ロタ②  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合② (+ ロタ③)  
 ↓ 4週あける  
 四種混合③ + BCG

ロタウイルスワクチンは飲み薬です

2回接種の製品と3回接種の製品があります

#### <③定期+B型肝炎ワクチン>

B型肝炎ワクチンの2回目の接種と  
3回目の接種の間隔に注意

肺炎球菌① + ヒブ① + B型肝炎①  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合① + B型肝炎②  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合②  
 ↓ 4週あける  
 四種混合③ + BCG  
 ↓ B型肝炎② 接種後4~5か月  
 B型肝炎③

#### <④フルパターン>

肺炎球菌① + ヒブ① + ロタ① + B型肝炎①  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌② + ヒブ② + 四種混合①  
 + ロタ② + B型肝炎②  
 ↓ 4週あける  
 肺炎球菌③ + ヒブ③ + 四種混合② (+ ロタ③)  
 ↓ 4週あける  
 四種混合③ + BCG  
 ↓ B型肝炎② 接種後4~5か月  
 B型肝炎③



1歳

#### <①定期接種のみ(基本パターン)>

麻疹風疹(MR)① + 肺炎球菌④ + ヒブ④ + 四種混合④



\* 1回2本以下のパターンにも変更できます  
おすすめプランその2をご参考くださいね

#### <②フルパターン>

麻疹風疹(MR)① + 肺炎球菌④ + ヒブ④ + 四種混合④

↓ 4週あける

水痘① + おたふく①

↓ 水痘① 接種後半年以降

水痘②

\* おたふく②は日本脳炎の接種時期(3~4歳)  
または麻疹風疹(MR)②の接種時期(年長)に



#### 3歳～4歳にかけて

日本脳炎①  
 ↓ 1~4週あけて  
 日本脳炎② (+ おたふく②)  
 ↓ 1年後(4歳)  
 日本脳炎③

#### 小学校入学前

麻疹風疹(MR)②  
 (+ おたふく②)

#### 小学校入学後

2種混合  
 日本脳炎2期  
 子宮頸がん予防ワクチン



## 予防接種スケジュール おすすめプラン その2

### 1回の受診で注射の本数を2本以下(両腕のみ)とするパターン

#### 生後2か月から1歳未満

##### <①定期接種のみ> (基本パターン)

- 肺炎球菌① + ヒブ①  
↓ 4週あける
- 肺炎球菌② + ヒブ②  
↓ 1週あける
- 四種混合①  
↓ 4週あける
- 四種混合② + ヒブ③  
↓ 4週あける
- 四種混合③ + 肺炎球菌③  
↓ 1週あける

BCG

##### <②定期+ロタウイルス>

- 肺炎球菌① + ヒブ① + ロタ①  
↓ 4週あける
- 肺炎球菌② + ヒブ②  
↓ 1週あける
- 四種混合① + ロタ②  
↓ 4週あける
- 四種混合② + ヒブ③(+ ロタ③)  
↓ 4週あける
- 四種混合③ + 肺炎球菌③  
↓ 1週あける

BCG

ロタウイルスワクチンは飲み薬です  
2回接種の製品と3回接種の製品があります



##### <③定期+B型肝炎>

- 肺炎球菌① + ヒブ①  
↓ 4週あける
- 肺炎球菌② + ヒブ②  
↓ 1週あける
- 四種混合① + B型肝炎①  
↓ 4週あける
- 四種混合② + B型肝炎②  
↓ 2週あける
- 肺炎球菌③ + ヒブ③  
↓ 2週あける
- 四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎② 接種後4-5か月

B型肝炎③

##### <④フルパターン>

- ロタリックス(2回接種)の場合
- 肺炎球菌① + ヒブ① + ロタ①  
↓ 4週あける
  - 肺炎球菌② + ヒブ②  
↓ 1週あける
  - 四種混合① + B型肝炎① + ロタ②  
↓ 4週あける
  - 四種混合② + B型肝炎②  
↓ 2週あける
  - 肺炎球菌③ + ヒブ③  
↓ 2週あける
  - 四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎② 接種後4-5か月

B型肝炎③

##### <④フルパターン>

- ロタテック(3回接種)の場合
- 肺炎球菌① + ヒブ① + ロタ①  
↓ 4週あける
  - 肺炎球菌② + ヒブ② + ロタ②  
↓ 4週あける
  - ヒブ③ + 四種混合① + ロタ③  
↓ 4週あける
  - 四種混合② + B型肝炎①  
↓ 4週あける
  - 四種混合③ + B型肝炎②  
↓ 1週あける
  - 肺炎球菌③ + BCG  
↓ B型肝炎② 接種後4-5か月

B型肝炎③

1歳

##### <①定期接種のみ(基本パターン)>

- 麻疹風疹(MR)① + 肺炎球菌④  
↓ 4週あける
- ヒブ④ + 四種混合④



\* 1回にたくさん接種するパターンにも変更できます  
おすすめプランその1をご参照くださいね

##### <②フルパターン>

- 麻疹風疹(MR)① + 肺炎球菌④  
↓ 4週あける
  - ヒブ④ + 水痘①  
↓ 4週あける
  - 四種混合④ + おたふく①  
↓ 水痘① 半年以降
  - 水痘②
- \* おたふく②は日本脳炎の接種時期(3~4歳)  
または麻疹風疹(MR)②の接種時期(年長)に

#### 3歳～4歳にかけて

- 日本脳炎①  
↓ 1-4週あけて
- 日本脳炎②(+ おたふく②)  
↓ 1年後(4歳)
- 日本脳炎③

#### 小学校入学前

- 麻疹風疹(MR)②  
(+ おたふく②)

#### 小学校入学後

- 2種混合
- 日本脳炎2期
- 子宮頸がん予防ワクチン